

Prednisone Cortancyl®

Présentation

Comprimés dosés à 1mg , 5mg et 20 mg. (1mg=non sécable)

Comment et quand prendre mon médicament ?

Modalités de prise :

1 fois par jour, de préférence le matin lors d'un repas.
Les comprimés peuvent être avalés intacts avec un grand verre d'eau.

Mon heure de prise est :



Matin:

Que dois je faire si j'oublie de prendre mon traitement ?

Si vous vous en rendez compte dans les **12 heures** suivant votre prise habituelle, prenez-le.
Dans le cas contraire, sautez la prise oubliée. Ne doublez pas la dose à la prise suivante.

Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament?

Ne soyez pas inquiet(e) à la lecture de la liste des effets indésirables. Il est possible que vous n'en ressentiez aucun. La plupart sont réversibles ou répondent à une baisse de la posologie. Les déclarer au médecin.

- ✓ **Trouble digestif:** ulcère gastro-intestinaux.
- ✓ **Troubles métaboliques:** Hyperglycémie, hypokaliémie, rétention hydro-sodée
- ✓ **Troubles cutanés:** Acné, Hyperpilosité = Pousse excessive de poils.
- ✓ **Troubles musculo-squelettiques:** Faiblesse musculaire, ostéoporose, risque de fracture.
- ✓ **Troubles neuropsychiques:** Insomnie, états confusionnels, excitation.
- ✓ **Autres:**
 - Hypertension artérielle, œdème, prise de poids.

Signalez tout effet indésirable à l'équipe médicale.

Quelles sont les interactions possibles avec mon traitement?

Certains médicaments peuvent **augmenter ou diminuer** l'action de la prednisone (Cortancyl®).

Ce sont des interactions.

Les topiques gastro-intestinaux et les anti-acides doivent se prendre à distance de la prednisone.

- ✓ **L'automédication** est déconseillée. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre des médicaments hors prescription.

Quelles sont les mises en garde avec mon traitement?

- ✓ Vous allez être plus sensible aux infections.
- ✓ Les vaccins vivants sont contre-indiqués.
- ✓ L'aspirine est déconseillé à des doses de 1g par prise ou supérieure ou égale à 3g/jour.
- ✓ Signalez que vous prenez de la prednisone à tous les médecins que vous consultez.

A quoi sert mon médicament ?

- ✓ La prednisone a pour nom de spécialité pharmaceutique Cortancyl®.
- ✓ C'est un corticoïde.
- ✓ Dans le cadre d'une greffe d'organe, il est indiqué pour la prévention du rejet de greffe et est associé à d'autres médicaments immunosuppresseurs.

Il est utilisé pour empêcher votre organisme de rejeter l'organe qui vous a été transplanté.

+++ Ce qu'il faut retenir +++

Prendre **régulièrement** son traitement est indispensable sinon les risques de rejet sont importants. Une prise supplémentaire peut augmenter les risques de toxicité.

Comment conserver mon médicament?

Conservez les comprimés à une température ne dépassant pas 30°C.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter:

- la coordination transplantation du CHB:

Tél: 01 45 59 64 22
entre 9h et 19h la semaine

Si vous n'arrivez pas à joindre la coordination:

- un pharmacien de l'hôpital :

Tél: 01 45 59 32 14

- votre médecin traitant

Pharmacie et CHB

Hôpital Paul Brousse

12, avenue Paul-Vaillant Couturier

94800 Villejuif

Février 2013

Prednisone CORTANCYL®

Fiche d'information aux patients transplantés hépatiques

**du Centre Hépatobiliaire (CHB)
de l'Hôpital Paul Brousse (Villejuif)**

*Ce fascicule est destiné à vous
aider à répondre à vos
éventuelles questions.*

